

大和徳洲会病院 乳がんレジメン一覧 (2020年7月)

進行・再発					
レジメン名	期間	投与方法	投与日	薬剤名 (一般名)	投与量
VNR+Trasutuzumab	21日	点滴静注	Day1・8	ビノレルビン	25mg/m ²
		点滴静注	Day1・8・15	トラスツヅマブ	4mg/kg (初回)、2mg/kg (2回目以降)
weekly PTX+Trasutuzumab	28日	点滴静注	Day1・8・15	パクリタキセル	80mg/m ²
		点滴静注	Day1・8・15・22	トラスツヅマブ	4mg/kg (初回)、2mg/kg (2回目以降)
Fulvestrant	28日	筋注	Day1	フルベストラント	500mg/body (導入時のみDay14にも投与)
(閉経後) Palbociclib+Fulvestrant	28日	筋注	Day1	フルベストラント	500mg/body (導入時のみDay14にも投与)
内服		Day1-21	パルボシクビル	125mg/body	
(閉経前) Palbociclib+Fulvestrant+LH-Rha	28日	筋注	Day1	フルベストラント	500mg/body (導入時のみDay14にも投与)
内服		Day1-21	パルボシクビル	125mg/body	
FEC60	21日	点滴静注	Day1	シクロホスファミド	500mg/m ²
		点滴静注	Day1	エピルピシン	60mg/m ²
		点滴静注	Day1	5-フルオロウラシル	500mg/m ²
weekly Trastuzumab	7日	点滴静注	Day1	トラスツヅマブ	4mg/kg (初回)、2mg/kg (2回目以降)
triweekly PAC	21日	点滴静注	Day1	パクリタキセル	175mg/m ²
3w PAC+3W Trastuzumab	21日	点滴静注	Day1	パクリタキセル	175mg/m ²
		点滴静注	Day1	トラスツヅマブ	8mg/kg (初回)、6mg/kg (2回目以降)
VNR+Trastuzumab	21日	点滴静注	Day1、8	ビノレルビン	25mg/m ²
		点滴静注	Day1、8、15	トラスツヅマブ	4mg/kg (初回)、2mg/kg (2回目以降)
Capecitabine+Lapatinib	21日	内服	Day1-14	カペシタビン	2000mg/m ²
		内服	Day1-21	ラパチニブ	1250mg/body
GEM+PAC	21日	点滴静注	Day1、8	ゲムシタピン	1250mg/m ²
		点滴静注	Day1	パクリタキセル	175mg/m ²
nab-PAC	21日	点滴静注	Day1	パクリタキセル (アルブミン懸濁型)	260mg/m ²
3w DOC+Trastuzumab	21日	点滴静注	Day1	ドセタキセル	60mg/m ²
		点滴静注	Day1	トラスツヅマブ	8mg/kg (初回)、6mg/kg (2回目以降)
DOC	21日	点滴静注	Day1	ドセタキセル	60mg/m ²
T-DM1	21日	点滴静注	Day1	トラスツヅマブエムタンシン	3.6mg/kg

※Pertuzumab、TrasutuzumabはHER2陽性乳がんのみ使用

※FulvestrantはLuminalタイプ乳がんを使用

※PalbociclibはLuminalタイプかつHER2陰性乳がんのみ使用